

Annexe 1: Tableau – phases 1 à 4 de la stratégie vaccinale, avec les recommandations du CSMI du 04.02.2021

Phase 1		Vaccin ARNm	Vaccin ChAdOx1
1a	Résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées		
	Quel que soit leur âge	préférence\$	
1b	Professionnels de santé et personnel des établissements de santé et de soins		
	Professionnels de la santé en exercice (y compris ambulanciers et first responders)		préférence£
	Personnel des établissements de santé (hôpitaux, structures d'hébergement et réseaux d'aide et de soins)		préférence£

Phase 2		Vaccin ARNm	Vaccin ChAdOx1
2a	Personnes hautement vulnérables en raison de leur âge		
	Personnes à partir de l'âge de 75 ans, en commençant par les plus âgées	préférence\$	
2b	Personnes hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant		
	Trisomie 21, adultes	préférence\$	
	Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrits sur une liste d'attente	préférence\$	
	Greffe de cellules souches hématopoïétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur	préférence\$	
	Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie)	préférence\$	
	Déficits immunitaires congénitaux	préférence\$	

§	la préférence n'est considérée que dans un contexte de pénurie vaccinale et est susceptible d'être levée dès réception de données solides concernant l'efficacité des produits vaccinaux disponibles dans ces groupes-cibles
£	la préférence n'est considérée que dans un contexte de pénurie vaccinale

Phase 3		Vaccin ARNm	Vaccin ChAdOx1
3a	Personnes significativement vulnérables en raison de leur âge		
	Personnes de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgées	préférence§	
3b	Personnes significativement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant		
	Immunodéficience acquise		
	médicamenteuse: immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive	préférence§	
	infection à VIH avec des CD4 <200/mm ³	préférence§	
	asplénie, fonctionnelle ou non	préférence§	
	Affection respiratoire chronique sévère		
	Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade GOLD 3 et 4, groupe D*		préférence£
	Mucoviscidose		préférence£
	Fibrose pulmonaire chronique sévère		préférence£
	Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance ventilatoire ou non		préférence£
	Asthme sévère non contrôlé (niveau 5 selon GINA)§ corticodépendant (sous corticothérapie orale)		préférence£
	Maladie cardiovasculaire sévère:		
	insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV#		préférence£
	coronaropathie instable		préférence£

	cardiomyopathie	préférence£
	Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS° ≤ 20)	préférence£
	Insuffisance rénale chronique dialysée	préférence£
	Cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh	préférence£
	Obésité morbide (indice de masse corporelle ≥ 40 kg/m2)	préférence£

Phase 4		Vaccin ARNm	Vaccin ChAdOx1
4a	Personnes modérément vulnérables en raison de leur âge		
	Personnes de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgées)	préférence\$	
4b	Personnes modérément vulnérables en raison d'un état de santé préexistant		
	Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires		préférence£
	Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée		préférence£
	Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques		préférence£

Annexe 2: Tableau - phases 1 à 6 de la priorisation de la vaccination contre la COVID-19, tel que retenu par le Conseil de gouvernement en date du 29.01.2021

Phase 1	
1	1a Personnes à très haut risque d'exposition
	<ul style="list-style-type: none">- Professionnels de la santé et personnel du secteur hospitalier (Personnes travaillant dans le secteur hospitalier)- Professionnels de la santé du secteur extrahospitalier (Médecins et professionnels de santé libéraux)- Personnel des structures d'hébergement pour personnes âgées (Personnel de santé et de soins travaillant dans les CIPA, maisons de soins et réseaux d'aides et de soins)- Résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap vivant dans des structures d'hébergement agréées

Phase 2	
	2a Personnes hautement vulnérables en raison de leur âge
	Personnes à partir de l'âge de 75 ans, en commençant par les plus âgées
	2b Personnes hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant
	Trisomie 21, adultes
	Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrites sur une liste d'attente
	Greffe de cellules souches hématopoïétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur
	Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie)
	Déficits immunitaires congénitaux

Phase 3

3a Personnes significativement vulnérables en raison de leur âge

Personnes de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgées

3b Personnes significativement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant

Immunodéficience acquise

médicamenteuse: immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive

infection à VIH avec des CD4 <200/mm³

asplénie, fonctionnelle ou non

Affection respiratoire chronique sévère

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade GOLD 3 et 4, groupe D*

Mucoviscidose

Fibrose pulmonaire chronique sévère

Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance ventilatoire ou non

Asthme sévère non contrôlé (niveau 5 selon GINA)§ corticodépendant (sous corticothérapie orale)

Maladie cardiovasculaire sévère:

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV#

coronaropathie instable

cardiomyopathie

Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS° ≤ 20)

Insuffisance rénale chronique dialysée

Cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh

Obésité morbide (indice de masse corporelle ≥ 40 kg/m²)

4a Personnes modérément vulnérables en raison de leur âge

Personnes de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgées)

4b Personnes modérément vulnérables en raison d'un état de santé préexistant

Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée

Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques

Phase 5

5a Personnes âgées de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgées

5b Personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré

Diabète équilibré, sans complication

Hypertension artérielle non compliquée

Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m²)

Phase 6

6a Catégories spécifiques de la population générale

Personnes précaires, vivant en collectivités, et non vaccinées antérieurement du fait de leur vulnérabilité

Autres personnes particulièrement exposées à l'infection du fait de leur activité

6b Population résidente générale

Population résidente générale de 16 à 54 ans, en commençant par les plus âgés, non vaccinée antérieurement du fait d'une vulnérabilité