


Enquête sur le tabagisme dans les établissements hospitaliers & de santé et les Lycées techniques pour professions de santé au Luxembourg

février – mars 2006

*conférence de presse
du 31 mai 2006*



Participation à l'enquête: 5997 questionnaires retournés répartition par secteur




Base: tous

Participation à l'enquête

- 12.880 questionnaires distribués par les établissements auprès de leurs collaborateurs
- 5.997 questionnaires retournés et validés : **taux de participation de 47 %**
- participation par secteur
 - secteur hospitalier - 7.855 questionnaires distribués / 3.325 valables : taux de participation 42%
 - long séjour - 3.889 questionnaires distribués / 1.779 valables : taux de participation 46%
 - lycées techniques pour professions de santé - 914 questionnaires distribués / 750 valables : taux de participation 82%
 - autres organismes participants – 222 questionnaires distribués / 143 valables : taux de participation 64%
- constitution de l'échantillon des répondants par rapport à l'univers enquêté:
 - secteur hospitalier: 61% de l'univers – 55% de l'échantillon
 - long séjour: 30% de l'univers – 30% de l'échantillon
 - LTPS: 7% de l'univers – 13% de l'échantillon
 - autres: 2% de l'univers – 2% de l'échantillon

Participation à l'enquête par établissement (les plus importants ->3%)




Base: tous

Encadrement

Responsable du service





Nombre de personnes encadrées



Base: tous

Base: chefs de services

Fumeurs – non-fumeurs




Base: tous


tabagisme – comparaison

enquête FLCC 2005 / enquête établissements 2006

population résidente en 2005 –
segments des actifs et des jeunes




hôpital sans tabac:
ensemble des réponses



Base: tous


Proportion de fumeurs selon l'âge



Base: tous

Proportion de fumeurs selon l'âge


comparaison enquête FLCC 2005 / enquête établissements 2006




Base: tous

Fumeurs – non-fumeurs par sexe

Hommes



Femmes




Base: tous


Fumeurs – non-fumeurs: femmes *comparaison*

enquête FLCC 2005 / enquête établissements 2006

population résidente en 2005 –
segments des actifs et des jeunes




hôpital sans tabac:
ensemble des réponses




Fumeurs – non-fumeurs: hommes *comparaison* *enquête FLCC 2005 / enquête établissements 2006*



population résidente en 2005 –
segments des actifs et des jeunes



hôpital sans tabac:
ensemble des réponses




Fumeurs selon le degré de responsabilité




Base: tous

Proportion de fumeurs




Base: tous

Proportion de fumeurs selon la profession



Base: tous

Proportion de fumeurs par lieu de travail



Base: tous

tabagisme – analyse (1)

- la proportion de fumeurs est moindre dans les établissements de santé: 32% de fumeurs (quotidiens 27% + occasionnels 5%) chez la population résidente des actifs (*enquête FLCC 2005*) et de jeunes contre 28% (quotidiens 21% + occasionnels 6%) – la différence essentielle se situe donc au niveau des fumeurs quotidiens
- il est intéressant de constater que les ‘ex-fumeurs’ sont bien plus nombreux dans les établissements de santé (15%) que dans la population comparable des résidents actifs (9%); la proportion des personnes n’ayant jamais fumé est au même niveau pour les 2 populations comparées
- par âge on observe néanmoins que la proportion des fumeurs est sensiblement plus élevée chez les mineurs (15-17 ans) donc les élèves des lycées pour professions de santé qu’auprès des jeunes en général; dans les établissements de santé la proportion de fumer est plus élevée à l’entrée dans la vie professionnelle, mais diminue plus rapidement ensuite que chez les actifs en général


tabagisme - analyse (2)

- la proportion de fumeurs varie fortement avec l'âge: le maximum est atteint dans les établissements de santé entre 18 et 24 ans, pour baisser ensuite de manière régulière et importante jusqu'à près de 40 ans (39% -> 22%); il semble que la génération des quadragénaires actuels reste davantage dépendante du tabac, la baisse générale par âge ne reprend qu'après 55 ans; remarquons que dans la population des actifs on observe une proportion de fumeurs particulièrement élevée pour les 50 à 54 ans
- la proportion de fumer est sensiblement la même chez les hommes et les femmes travaillant dans les établissements de santé; observons que si les hommes travaillant dans ce secteur (28% de fumeurs) se différencient fortement des hommes actifs en général (36% de fumeurs) il n'y a en revanche guère de différence pour les femmes
- les personnes ayant la responsabilité d'encadrement dans les établissements de santé sont plus nombreuses à avoir arrêté de fumer (20% contre 14%), la proportion initiale de fumeurs étant quasi identique pour les deux segments (58% contre 57%)

tabagisme - analyse (3)


- par secteur d'activité dans le monde de la santé il existe des différences importantes – si la proportion de fumeurs est de 23% dans le secteur hospitalier elle est de 34% dans les établissements de long séjour (maisons de soins, de retraite ...), niveau atteint également dans les lycées pour professions de santé (35%), proportion supérieure à la moyenne de la population des actifs et jeunes (32%)
- selon la profession il faut relever les proportions particulièrement élevées de fumeurs chez les élèves des lycées pour professions de santé d'un côté et de l'autre les aides socio-familiales; les proportions sont particulièrement faibles chez les enseignants, les médecins et les professions de santé qualifiées autres que les soignants

Consommation journalière moyenne de cigarettes (ou équivalent pipes ou cigares) par type de fumeur et secteur




Base: tous

Consommation journalière moyenne de cigarettes (ou équivalent pipes ou cigares) par profession




Base: tous

Combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?




Base: fumeurs quotidiens

Fumez-vous (dans votre établissement) pendant les heures de travail et/ou pendant les pauses ?




Consommation journalière de cigarettes durant les heures de travail et / ou pendant les pauses



Base: fumeurs


Fumez-vous (dans votre établissement) pendant les heures de travail et/ou pendant les pauses ?

fumeurs quotidiens




non - réponse
11%

fumeurs occasionnels



Base: fumeurs


Quand vous fumez sur le lieu de travail, vous fumez ...




Base: tous

Vous arrive-t-il d'être gêné par la fumée d'autres personnes à l'intérieur de l'établissement ?

non-fumeurs



fumeurs




total gêne ressentie

*hôpital : 54 %
long séjour: 45%
lycée: 62 %
ensemble: 52%*


Base: tous

Intention d'arrêter de fumer

Fumeur occasionnel





Fumeur quotidien



Base: fumeurs

Combien de fois avez-vous sérieusement essayé d'arrêter de fumer ? (1)


Fumeur occasionnel




Base: fumeurs

Combien de fois avez-vous sérieusement essayé d'arrêter de fumer ? (2)

hommes




femmes



Base: fumeurs


Avez-vous reçu des informations sur l'arrêt du tabac dans votre établissement ?




Base: fumeurs

Estimez-vous que votre établissement devrait développer des initiatives en faveur d'un établissement de santé / école sans tabac ?


Hôpital



Long séjour




Lycée de santé



Base: tous

Qui devrait entreprendre ces mesures pour parvenir à un établissement de santé / école sans tabac ?



Base: personnes estimant que leur établissement devrait développer des initiatives en faveur d'un établissement de santé / école sans tabac

tabagisme - analyse (4)

- près de la moitié des fumeurs quotidiens allument leur première cigarette dans la demi-heure suivant le réveil, 13% endéans les premières 5 minutes
- 75% des fumeurs fument sur leur lieu de travail: 87% des fumeurs quotidiens, 36% des fumeurs occasionnels ; 69% dans les hôpitaux, 84% dans les établissements de long séjour – le lieu de travail est donc un lieu permanent de consommation tabagique, même si 90% des répondants indiquent fumer moins de 10 cigarettes par jour sur leur lieu de travail, cela se passe surtout dans des zones fumeurs, mais également à l'extérieur des bâtiments
- par ailleurs 6 personnes non-fumeurs sur 10 se disent gênées par la fumée, dont 2 sur 10 quotidiennement
- près d'un fumeur quotidien sur quatre a l'intention de s'arrêter de fumer dans un avenir proche
- il n'y a qu'à peu près un quart (27%) de tous les fumeurs qui n'envisagent pas du tout d'arrêter de fumer, un tiers des hommes fumeurs a cette attitude, de même que la moitié des fumeurs de 55 ans et plus

tabagisme - analyse (5)

- 7 fumeurs sur 10 ont déjà essayé d'arrêter de fumer et parmi ceux-ci 4 l'ont déjà essayé à plusieurs reprises, les fumeurs quotidiens plus fréquemment que les fumeurs occasionnels
- l'information dispensée sur l'arrêt de fumer touche son public essentiellement dans les lycées pour professions de santé (3 élèves sur 4); dans les hôpitaux ce rapport est de 1 collaborateur sur 2 et dans le long séjour 1 sur 3 seulement – secteur où le travail de sensibilisation devra être renforcé
- deux tiers des collaborateurs des hôpitaux aimeraient que leurs établissements prennent des initiatives en faveur d'un 'hôpital sans tabac'; une telle initiative ne semble pas faire l'unanimité, car ce souhait n'est partagé que par la moitié des collaborateurs dans les établissements de long séjour et les lycées pour professions de santé
- ce genre d'initiative est en premier lieu du domaine de responsabilité des directions selon les répondants, loin devant l'option d'une intervention réglementaire des autorités publiques