

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HÉPATITES, 28 JUILLET : DÉPISTAGE ET VACCINATION !

LES HÉPATITES SONT DES MALADIES VIRALES. ON DISTINGUE PLUSIEURS VIRUS DIFFÉRENTS DE L'HÉPATITE : A, B, C, ... ILS OCCASIONNENT UNE INFECTION DU FOIE.

Le dépistage consiste en une simple prise de sang : ne pas hésiter à s'adresser à son médecin.

Le test de dépistage peut également être fait gratuitement et anonymement grâce à un test rapide réalisé dans le DIMPS (Dispositif d'Intervention Mobile pour la Promotion de la Santé sexuelle).

Les lieux et horaires de passage du Dimps sont consultables sur le site www.dimps.lu

LA RECHERCHE AU LUXEMBOURG

Entre 2011 et 2015 près de 240 personnes infectées par le virus de l'hépatite C (HCV) ont participé à une étude du Luxembourg Institute of Health (LIH) sur les résistances développées aux traitements. Actuellement, 2 études s'adressant aux usagers de drogues pour qui le risque de transmission est particulièrement élevé, sont en cours :

HCV-UD : étude réalisée sur base d'un questionnaire et d'un suivi biologique permettant aux participants de connaître leur état de santé. Elle a pour but de mieux connaître leur mode de consommation et les facteurs de risques associés, d'évaluer l'efficacité des nouveaux traitements et d'améliorer les actions de prévention. Cette étude, actuellement proposée à l'Abrigado et au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), le sera bientôt aussi à la Jugend-an-Drogenhelf.

HCV-CPL : les participants bénéficient d'un suivi annuel de leur infection en prison et fournissent des données descriptives (taux de réinfection, facteurs de risque etc.) qui permettront de mieux comprendre, traiter ou prévenir cette épidémie. L'étude permet aussi de mettre les participants en lien avec les programmes OST (Opioid Substitution Therapy) visant à arrêter leur consommation.



LUXEMBOURG
INSTITUTE
OF HEALTH
RESEARCH DEDICATED TO LIFE



croix-rouge
luxembourgeoise
Santé HIV Beratung
Hépatites, IST et VIH



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la santé

Sante.lu



ELLE NE
PENSAIT PAS
s'infecter avec une
HÉPATITE A



IL NE
PENSAIT PAS
rentrer avec une
HÉPATITE B



ELLE NE
PENSAIT PAS
repartir avec une
HÉPATITE C

PENSEZ AU DÉPISTAGE ET À LA VACCINATION !

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HÉPATITES,
28 JUILLET



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la santé

HÉPATITE A

ZONES TOUCHÉES

Endémique en Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique latine.

TRANSMISSION

- **Rapports sexuels oraux-anaux.**
- **Contact avec des eaux contaminées** (vaisselle, aliments lavés avec de l'eau contaminée).

PRÉVENTION

Vaccination.

TRAITEMENT

Aucun, guérison spontanée dans la plupart des cas.

HÉPATITE B

ZONES TOUCHÉES

Universelle : 350 millions de personnes vivent avec l'Hépatite B. **Il s'agit de la 1ère Infection Sexuellement Transmissible au monde !**

TRANSMISSION

- **Liquides sexuels** (rapports sexuels vaginaux et anaux, fellations).
- **Sang, dérivés sanguins** (partage de matériel d'injection de drogues).
- **Tatouages et piercings réalisés dans de mauvaises conditions d'hygiène.**
- **Salive** (baiser).

PRÉVENTION

Vaccination ; vaccination universelle de tous les nourrissons au GDL.

TRAITEMENT

Peu efficace, l'Hépatite B devient chronique chez 5% des personnes atteintes (risque de cancer du foie).

HÉPATITE C

ZONES TOUCHÉES

Universelle : 170 millions de personnes vivent avec l'Hépatite C dans le monde.

TRANSMISSION

- **Sang, dérivés sanguins** (partage de tout matériel d'injection ou d'inhalation de drogues).
- **Rapports sexuels lors de présence de sang** (règles/menstruations, plaies au niveau du vagin, anus, pénis).
- **Tatouages, piercing et implants micro-dermiques réalisés dans de mauvaises conditions d'hygiène.**

PRÉVENTION

Il n'existe pas de vaccin contre l'Hépatite C !!!

- Pas de partage de matériel de consommation et/ou d'injection de drogues.
- Pas de partage d'ustensiles hygiéniques (brosse à dent, rasoir, coupe ongle).

- Tatouages, piercings et implants micro-dermiques à réaliser dans des conditions d'hygiène maximales.
- Utilisation du préservatif accompagné de lubrifiant lors des rapports sexuels vaginaux et anaux.

TRAITEMENT

L'hépatite C devient chronique dans 70% des cas (risque de cirrhose et de cancer du foie). Traitement à base d'antiviraux, pour une durée de 12 à 24 semaines, permettant d'atteindre des taux de guérison supérieurs à 90%.

DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE C

Concerne toute personne ayant potentiellement été exposée au virus de l'hépatite C au moins une fois dans sa vie.

